

GASTROENTÉROLOGIE—GASTRO-1
PATIENT PRÉSENTANT LES SIGNES CLINIQUES D'UNE RECTORRAGIE SIGNIFICATIVE

- **Professionnels habilités :** Infirmière clinicienne travaillant à l'accueil clinique du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal
- **Clientèle visée :** Patient référé par un médecin du territoire pour de la rectorragie significative (i.e. sang rouge-bourgeois, présence de caillots, quantité de sang importante dans la toilette / sur une serviette hygiénique)
- **Indications :** Répondre aux critères d'admissibilité de l'accueil clinique

CRITÈRES D'EXCLUSION (DIRIGER LE PATIENT VERS L'URGENCE) : Patient âgé de plus de 80 ans, anticoagulothérapie en cours, plus de 2 épisodes de rectorragie significative et /ou méléna en 12 heures, douleur abdominale intense non soulagée par analgésie ou rendant l'utilisateur non fonctionnel; hémoglobine de moins de 80 g/L; Signes et risques de déshydratation : lipothymie, hypotension orthostatique (souvent présence d'étourdissement), oligurie de plus de 12 heures, vomissements répétitifs, T°B de 38,5 °C et plus; FC de 100/minute et plus, PAS de 100 mm Hg et moins, grossesse.

Médecin vigie : Dr. Petru Comanita, gastroentérologue
 Révisé en mars 2015



ACCUEIL CLINIQUE

